

輸血副作用の症状項目についての補足説明書

1) 発熱

輸血開始後、38 以上に上昇した場合、輸血前から発熱している場合は輸血開始後に1 以上の上昇が認められた場合。

2) 悪寒・戦りつ

寒い感じ、体の震え感

3) 熱感・ほてり

体が熱いまたはホテッタ感じ

4) そうよう感・かゆみ

体がかゆい、またはかゆい感じ

5) 発赤・顔面紅潮

膨隆を伴わない皮膚の赤い皮疹、顔面が赤くなった場合

6) 発疹・じんま疹

膨隆を伴った皮疹

7) 呼吸困難

努力性呼吸などの呼吸困難、チアノーゼ、喘鳴などの症状、SpO₂の低下などが認められた場合

8) 嘔気・嘔吐

9) 胸痛・腹痛・腰背部痛

10) 頭痛・頭重感

11) 血圧低下

輸血開始後、収縮期血圧が 30 mmHg 以上の低下を認めた場合

12) 血圧上昇

輸血開始後、正常血圧より収縮期血圧が 30 mmHg 以上の上昇を認めた場合

13) 動悸・頻脈

ドキドキとした感じ、成人の場合は脈拍数が 100 回 / 分以上に上昇した場合、小児に関しては対象年齢による頻脈の定義に従う

14) 血管痛

15) 意識障害

意識低下、意識消失などの場合

16) 赤褐色尿（血色素尿）